

Reanimeren & defibrilleren (AED)

- Zorg voor veiligheid.

- Ga na of het slachtoffer bij bewustzijn is.

1



ALS HET SLACHTOFFER BEWUSTELOOS IS:

- Roep luid om hulp.
- Open de luchtweg. Controleer de ademhaling.

2



ALS HET SLACHTOFFER NIET MEER NORMAAL ADEMT:

- Laat de hulpdiensten alarmeren of doe dit zelf:

112

3

Laat een automatische externe defibrillator (AED) halen of doe dit zelf.



4

- Start met reanimeren tot de AED er is.

- Wissel 30 hartmassages af met 2 beademingen.

5



- Activeer de AED en volg de instructies van de adviesstem van de AED.

- Bevestig de elektroden op de borstkas.

6



- Hou afstand als het toestel het hartritme gaat analyseren en als het gaat schokken. Zorg dat niemand het slachtoffer aanraakt!

- Reanimeer als het toestel dit aangeeft. Wissel 30 hartmassages af met 2 beademingen.

7



STOP MET REANIMEREN ALS HET SLACHTOFFER OPNIEUW NORMAAL ADEMT. LEG HET SLACHTOFFER IN STABIELE ZIJLIGGING ALS HET DAN NOG BEWUSTELOOS BLIJFT.



www.hartveilig.be

Paraat. Altijd, overal.


Rode Kruis
Vlaanderen